

**ADULTE PRÉSENTANT DES SIGNES OU SYMPTÔMES ÉVOCATEURS**

**ADULTE À RISQUE**

**PATHOLOGIE À RISQUE**

**APPARENTÉ AU 1<sup>er</sup> DEGRÉ**

**Typage HLA DQ2/DQ8**

**POSITIF**

**NÉGATIF**

**STOP : pas de risque de maladie cœliaque <sup>(1)</sup>**

à répéter tous les 3 à 5 ans

**Sérologie IgA anti-transglutaminase + dosage sérique des IgA totaux**

**IgA anti-transglutaminase POSITIFS**

**IgA anti-transglutaminase NÉGATIFS**

**Dosage des IgA totaux BAS**

**Dosage des IgA totaux NORMAL**

**IgG anti-transglutaminase <sup>(2)</sup>**

**POSITIFS**

**NÉGATIFS**

**Risque de FAUX NÉGATIF ? <sup>(4)</sup>**

**OUI**

**NON**

**EOGD AVEC BIOPSIES DUODÉNALES**

**HISTOLOGIE COMPATIBLE**

**DOUTE HISTOLOGIQUE**

**DIAGNOSTIC DE MALADIE CŒLIAQUE**

**AVIS SPÉCIALISÉ : explorations additionnelles (IgA anti-endomysium ? typage HLA ? répéter les tests après quelques mois ?)**

**PAS DE MALADIE CŒLIAQUE ACTUELLEMENT <sup>(5)</sup>**

<sup>(3)</sup>