

ENFANT OU ADOLESCENT SYMPTOMATIQUE

ENFANT OU ADOLESCENT À RISQUE

Typage HLA DQ2/DQ8

POSITIF

NÉGATIF

STOP : pas de risque de
maladie cœliaque ⁽¹⁾

à répéter périodiquement

Sérologie IgA anti-transglutaminase + dosage sérique des IgA totaux

IgA anti-transglutaminase POSITIFS

IgA anti-transglutaminase NÉGATIFS

IgA anti-transglutaminase > 10 N

IgA anti-transglutaminase < 10 N

Dosage des IgA totaux BAS

Dosage des IgA totaux NORMAL

IgA anti-endomysium
(sur un 2^{ème} prélèvement)IgG anti-transglutaminase ⁽²⁾

POSITIFS

NÉGATIFS

POSITIFS

NÉGATIFS

Risque de FAUX NÉGATIF ? ⁽³⁾AVIS SPÉCIALISÉ :
typage HLA ?
biopsies
d'emblée ?

EOGD AVEC BIOPSIES DUODÉNALES

HISTOLOGIE COMPATIBLE

DOUTE HISTOLOGIQUE

OUI

NON

DIAGNOSTIC DE MALADIE CŒLIAQUE

AVIS SPÉCIALISÉ :
explorations additionnelles (IgA anti-
endomysium ? typage HLA ? répéter
les tests après quelques mois ?)AVIS SPÉCIALISÉ :
répéter le test après 3 mois ?
typage HLA ?PAS DE MALADIE
CŒLIAQUE
ACTUELLEMENT
⁽⁴⁾