

**Votre enfant (de 6 ans et plus) présente une gastro-entérite.  
Traitement médicamenteux :**

**Votre médecin prescrit un traitement adapté au cas de votre enfant :**

- **Il vous donne des conseils diététiques et de réhydratation** (il prescrit éventuellement à votre enfant un soluté de réhydratation orale (SRO) à utiliser sans limitation).

**En cas de gastro-entérite virale** (cas le plus fréquent), la prise de SRO est en général suffisante.

**À savoir :** Ces boissons sucrées-salées sont facilement acceptées par les nourrissons. **En revanche, les enfants plus grands apprécient moins leur goût.**

SRO : ADIARIL® / NOVALAC HYDRANOVA® / PHYSIOSALT® / SACOLENE® / VIATOL® / YDROVIT®

- **Les médicaments ne sont pas systématiquement prescrits. Ils ne sont utiles que dans certaines formes de gastro-entérites.**

- **Pour diminuer l'intensité de la diarrhée et sa durée, votre médecin peut prescrire :**

- des **probiotiques** (non remboursés par l'Assurance Maladie) ;
- des pansements digestifs comme le **diosmeticte** (Smecta®) ;
- du **racécadotril** (Tiorfan®).

**Par contre :**

- les autres anti-diarrhéiques de type **lopéramide** (Imodium®) **ne sont pas recommandés** en cas de gastro-entérite de l'enfant et sont même contre-indiqués en cas de diarrhée d'origine bactérienne.
- **Les médicaments antiémétiques (contre les vomissements) ne sont pas recommandés, voire contre-indiqués pour certains.**
- **Les antibiotiques sont inactifs sur les virus et sont donc inutiles en cas de gastro-entérite virale.**
- **En cas de gastro-entérite d'origine bactérienne, un traitement antibiotique n'est pas systématiquement nécessaire.** Il sera prescrit à votre enfant si le médecin le juge nécessaire.
- En cas de gastro-entérite d'origine parasitaire, un médicament antiparasitaire sera prescrit par votre médecin. Il est parfois nécessaire de traiter simultanément les autres membres de la famille ou de la collectivité.
- **N'utilisez pas d'anti-inflammatoires non stéroïdiens si votre enfant a des douleurs ou de la fièvre car ils sont contre-indiqués en cas de déshydratation. Utilisez du paracétamol.**

- **La gastro-entérite, dans les cas sévères, peut nécessiter que votre enfant soit hospitalisé pour être réhydraté** grâce à une sonde introduite par le nez et placée dans l'estomac (sonde nasogastrique) ou par perfusion.

**NB :** Le plus souvent, la gastro-entérite de l'enfant est virale et aucun examen complémentaire n'est utile. Le médecin prescrira une analyse des selles (coproculture, examen parasitologique des selles), s'il craint une infection intestinale bactérienne ou parasitaire.

Date :

Signature :

Cachet du médecin