

DYSPHAGIE :
Sensation de gêne ou d'obstacle à la progression du bol alimentaire au cours de la déglutition

DYSPHAGIE OROPHARYNGÉE
(gêne localisée au niveau cervical, difficultés à initier la déglutition)

**PRISE EN CHARGE
ORL / NEUROLOGIQUE**

DYSPHAGIE ŒSOPHAGIENNE
(gêne localisée au niveau rétrosternal)

**ENDOSCOPIE ŒSO-GASTRO-DUODÉNALE (EGD)
AVEC BIOPSIES SYSTÉMATIQUES**

ANOMALIE(S) À L'EGD

DYSPHAGIES LÉSIONNELLES / ORGANIQUES :

- Sténoses tumorales :
 - Carcinome épidermoïde
 - Adénocarcinome œsophagien
 - Tumeurs bénignes
 - Compression tumorale ou ganglionnaire extrinsèque
- Sténoses non tumorales :
 - Peptiques
 - Caustiques
 - Anneau de Schatzki...
- Œsophagites sans sténose :
 - Médicamenteuses
 - À éosinophiles
 - Infectieuses...

**SIGNE(S) INDIRECT(S) EN FAVEUR D'UN
TROUBLE DE MOTILITÉ ŒSOPHAGIENNE ISOLÉS***

MANOMÉTRIE ŒSOPHAGIENNE HAUTE RÉOLUTION

TROUBLES DE LA MOTILITÉ ŒSOPHAGIENNE :

- Achalasie du sphincter inférieur de l'œsophage
- Spasmes œsophagiens
- Œsophage hypercontractile « marteau-piqueur »
- Péristaltisme œsophagien inefficace ou absent

- Trouble fonctionnel œsophagien (dysphagie fonctionnelle) :
diagnostic d'élimination

Autres diagnostics :

- Odynophagie
- *Globus hystericus*
- Dyspepsie
- Anorexie
- Xérostomie...