

**Votre nourrisson (0-2 ans) présente une gastro-entérite.  
Surveillance :**

**Paramètres à surveiller tout particulièrement :**

- **Pesez** votre bébé pour dépister une éventuelle déshydratation ;
- **Prenez sa température** régulièrement ;
- Comptez et notez le **nombre de selles et de vomissements** ;
- Comptez et notez le **nombre de biberons bus et le volume de liquide absorbé (SRO)** ;
- **Surveillez son comportement et son apparence** : est-il agité ou trop endormi ? respire-t-il vite ? pleure-t-il faiblement ? mouille-t-il moins ses couches ? est-il cerné ? a-t-il la langue sèche ?

**La principale complication de la gastro-entérite de l'enfant est la déshydratation.**

**Il est donc important de connaître les signes de déshydratation et de consulter sans délai votre médecin ou de vous adresser au service des urgences de l'hôpital si :**

- **votre enfant présente des signes de déshydratation :**
  - il est anormalement agité ou au contraire est apathique et dort beaucoup ;
  - il est difficile à réveiller et gémit ;
  - il a un comportement inhabituel ;
  - il est pâle et a les yeux cernés ;
  - il a les extrémités (mains, pieds) froides et la peau marbrée ;
  - il a la langue sèche ;
  - il respire rapidement ;
  - il a moins de larmes que d'habitude quand il pleure
  - il urine peu ;
  - il a une perte de poids de plus de 5%.
  
- **votre enfant :**
  - a de la fièvre et est âgé de moins de 3 mois ;
  - ne boit plus (refuse notamment de prendre le soluté de réhydratation orale prescrit) ;
  - continue de vomir malgré l'ingestion de soluté de réhydratation orale (SRO) ;
  - vomit de la bile ;
  - a des selles liquides qui persistent plus de deux jours, qui s'aggravent ;
  - a de la diarrhée qui s'accompagne d'une fièvre supérieure à 38,5 °C ;
  - présente des selles contenant des glaires ou du sang.

Date :

Signature :

Cachet du médecin